

Появата на възловидни кожни лезии обикновено започва 48 часа след началото на треската. Те могат да бъдат многообразни по цялото тяло (фиг. 2) или могат да бъдат само няколко. Възелчетата могат да изчезнат без последствия или да се разявят (фиг. 3). Най-често тези изменения се наблюдават по кожата на главата, врата, перинеума, гениталиите (фиг. 4), вимето (фиг. 4 и 5) и крайниците. Нодулите (възелчетата) са с размер 5 до 50 mm в диаметър, кръгли и набъбнали и включват кожата, подлежащите мускули. Белезите могат да останат за неопределено време, като по този начин правят кожата негодна.

Биците губят плодовитостта си, а бременните крави могат да абортят.

ДИАГНОСТИКА

Заразният нодуларен дерматит има много типични клинични при знаци и изменения, лесно разпознавани от ветеринарни лекари и фермери.

Болестта задължително се потвърждава лабораторно. Подходящи преби за откриване на вирус са кожните изменения и цяла кръв.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Избягвайте контакти между животни от различни стада, посещения на други животновъдни обекти, размяна и споделяне на животни, инструменти, превозни средства с други ферми.

Извършвайте профилактична дезинсекция на животновъдните Ви обекти и обработка на животните Ви срещу насекоми съгласно инструкциите на БАБХ:

- <http://www.babkh.govment.bg/userfiles/files/ZHOJKF/Zapovedi/Instruction%20farmers%20Desinsection.pdf>
- <http://babh.govment.bg/uploads/File/Doc/Health/Blue-tongue/>



Телефон за контакт:
02 915 98 42



Фигура 4. Възловидни образувания по вулвата, перинеума и вимето при говедо, болно от заразен нодуларен дерматит



Фигура 5. Изменения по вимето при говедо, болно от заразен нодуларен дерматит

ВНИМАНИЕ!

Всяко съмнение за Заразен нодуларен дерматит, трябва незабавно да се съобщава на ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и е от съществено значение за ограничаване на по нататъшното и разпространение!